МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

Архангельск, 16 ноября 2017 года

Докладчик: Марк Азриельевич Вайсман,
к.м.н., доцент кафедры паллиативной медицины
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва

Stuart Bradford

БОЛЬ –

- самый отчетливо осознаваемый симптом у взрослых пациентов,
- одна из наиболее частых жалоб при первичном обращении к врачу;
- 22% из впервые обратившихся к врачу страдают от хронической боли;
- тема около 55% ежегодных публикаций в медицинской литературе.

(ВОЗ, 1998)

Более 70% пациентов страдают хронической болью до 3 лет, около 1/3 из них – более 10 лет.

(ACPA, 2005)

Наиболее распространенные виды хронической боли:

- головная,
- в спине,
- онкологического генеза,
- суставная,
- нейрогенная,
- психогенная.

Распространенность патологических симптомов в течение финального года жизни *



* Higginson I. *Epidemiologically based needs assessment for palliative and terminal care.* Abingdon, Radcliffe Medical Press, 1997.

Хроническая боль

приобретает патологический характер,

так как вызывает целый комплекс

дезадаптивных реакций,

представляющих опасность

для биологической

целостности организма

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА

- ответственность
- взаимоотношения
- привязанность/сексуальная активность
- внешний вид
- трудовая деятельность

- страдание
- восприятие боли
- религиозность



- активность
- утомляемость
- качество сна
- тошнота
- аппетит
- запор

- беспокойство
- депрессия
- удовольствие/ отдых
- счастье
- страх
- внимание

Лечение хронической боли онкологического генеза. *Учебное пособие. Под ред.* ***Новикова Г.А., Осиповой Н.А., Москва , 2006***

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА

- ответственность
- взаимоотношения
- привязанность/сексуальная активность
- внешний вид
- трудовая деятельность

- страдание
- восприятие боли
- религиозность




- активность
- утомляемость
- качество сна
- тошнота
- аппетит
- запор

- беспокойство
- депрессия
- удовольствие/ отдых
- счастье
- страх
- внимание

Лечение хронической боли онкологического генеза. *Учебное пособие. Под ред.* ***Новикова Г.А., Осиповой Н.А., Москва , 2006***

Хроническая боль: адекватность лечения*

Существующая практика зачастую
не обеспечивает адекватного лечения



В среднем 64% опрошенных свидетельствуют о неадекватной терапии боли
(n=2450)

* Harald Breivik et al. *European Journal of Pain 10 (2006) 287-333*

Эпидемиология боли онкологического генеза

59% при проведении радикального лечения

33% после проведения лечения

64% при генерализации опухоли

Van den Beuken et al. Ann Oncol 2007
Ripamonti et al. ESMO Guidelines, Ann Oncol 2012

Факторы, определяющие индивидуальную оценку боли:

- локализация и характер повреждения,
- природа повреждающего фактора,
- психологическое состояние и индивидуальный жизненный опыт пациента

Выраженность боли может не соответствовать объективной тяжести повреждения, поскольку определяющим в интерпретации болевого ощущения является психоэмоциональное состояние индивидуума!

Своевременная диагностика и лечение хронической боли :

- повышают качество и эффективность обезболивания
- снижают обращаемость пациентов за помощью к онкологам и медицинскому персоналу
- улучшают качество жизни онкологических больных

Системная фармакотерапия анальгетиками и адъювантами обеспечивает адекватное обезболивание у 85-90% пациентов

WHO. Cancer pain relief, 2nd ed. Geneva, WHO, 1996

Мировой оборот анальгетических препаратов в 2005 г. составил $50 млрд.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЕ


Неопиоидные анальгетики:

- *желудочно-кишечные,*
- *сердечно-сосудистые,*
- *гепато- и миелотоксичность.*

Опиоидные анальгетики:

- *запор,*
- *тошнота и рвота,*
- *умеренное седативное действие,*
- *риск угнетение дыхания и сознания.*

Лекарственные средства, принимаемые пациентами по рекомендации врача для лечения хронической боли*



* Harald Breivik et al. *European Journal of Pain 10 (2006) 287-333*

Патогенетические типы боли:

- **ноцигенный,**
- **нейрогенный,**
- **психогенный**

При хронической боли онкологического генеза возможно сочетание нескольких патогенетических механизмов!

Профессиональная компетенция по комплексной оценке и определению тактики лечения хронической боли

Медицинский работник должен:

- **знать этиологию, патогенез и принципы лечения хронической боли**
- **понимать особенности различных видов хронических болевых синдромов**
- **уметь назначить соответствующее эффективное противоболевое лечение**

Трехступенчатая схема ВОЗ

3 сильная боль

Морфин

Фентанил

Бупренорфин

± Адъювантные препараты

2 умеренная боль

Кодеин

Трамадол

± Адъювантные препараты

1слабая боль

Аспирин

Парацетамол

НПВС

± Адъювантные препараты

Применение опиоидов для лечения хронической онкологической боли в Европе

3030 онкологических больных в 143 подразделениях паллиативной помощи в 21 Европейской стране.

Умеренная боль:

кодеин (8%),

трамадол (8%),

декстропропоксифен (5%)

дигидрокодеин (2%).

Интенсивная боль:

п/о морфин (21%+19%);
в/в и п/к морфин (10%);
ТТС фентанила (14%);
оксикодон (4%),
метадон (2%),
диаморфин (2%)
гидроморфон (1%)

Klepstad, Kaasa, Cherny, Hanks, de Conno, 2005

Преимущества ТТС фентанила

- **Высокая биодоступность благодаря отсутствию первичного прохождения через печень**
- **Контролируемое высвобождение препарата – постоянный равновесный уровень в плазме**
- **Длительный период действия – 72 ч**
- **Удобство применения приводит к повышению комплаентности пациентов к данному виду обезболивания**

Matrifen Product monograph. Available at: http://www.matrifen.com/~/media/products/matrifen_com/protected/files/monograph.pdf (Accessed March 2015).

Виды трансдермальных систем

Мембрана - резервуар

(резервуар с жидким веществом)

1-е поколение



Матрикс

2-е поколение




Фендивия


(мембрана+ матрикс

с веществом в виде капель)

3-е поколение




Применение ТТС фентанила для лечения хронической боли онкологического генеза



ММВ=морфин медленного высвобождения ТТСФ=трансдермальная терапевтическая система с фентанилом.

Ahmedzai S, Brooks D. *J Pain Symptom Manage* **1997**;13:254-61.


Применение ТТС фентанила для лечения хронической боли онкологического генеза



ММВ=морфин медленного высвобождения ТТСФ=трансдермальная терапевтическая система с фентанилом

Ahmedzai S, Brooks D. *J Pain Symptom Manage* **1997**;13:254-61.


Применение ТТС фентанила для лечения хронической боли онкологического генеза



ММВ=морфин медленного высвобождения ТТСФ=трансдермальная терапевтическая система с фентанилом.


Ahmedzai S, Brooks D. *J Pain Symptom Manage* **1997**;13:254-61.

Профиль безопасности ТТС фентанила:
объединенный анализ 11 клинических исследований (n = 1854) *



- Matrifen SPC **2014**. Available at: http://www.medicines.org.uk/emc/print-document?documentId=19278 (Accessed March 2015).

Применение ТТС фентанила для лечения хронической боли неонкологического генеза




Пациенты оценили контроль боли как "хороший" или "очень хороший" к концу исследования

ММВ=морфин медленного высвобождения ТТСФ=ТТС с фентанилом.

Allan L, et al. *BMJ* **2001**;322:1154-8.


Применение ТТС фентанила для лечения хронической боли неонкологического генеза



ММВ=морфин медленного высвобождения ТТСФ=ТТС с фентанилом.

Allan L, et al. *BMJ* **2001**;322:1154-8.

Сравнение нежелательных явлений ТТС фентанила и морфина медленного высвобождения



Clark AJ, et al. *Curr Med Res Opin* 2004;20:1419-29.

Преимущества трансдермального введения

ТТС фентанила:

- **Обеспечивает обезболивание, сравнимое с морфином при онкологической боли и превосходит морфин у пациентов, страдающих от хронической боли неонкологического генеза**
- **Характеризуется дополнительными преимуществами: неинвазивный метод и непрерывная доставка фентанила в течение 72 часов**
- **В сравнении с морфином:**
  - **вызывает меньшее количество случаев констипации, рвоты и тошноты**
  - **имеет минимальное влияние на психомоторные и когнитивные функции пациентов**

Большинство пациентов предпочитают ТТС фентанила другим доступным препаратам!

Важные постулаты ВОЗ *

(Opioids and Palliative Care on the WHO EML(c), Geneva, 8 April 2013)

- **Доступность морфина и двух альтернативных опиоидов – необходимое требование для адекватной терапии боли у детей и взрослых пациентов**

- **Паллиативная помощь – для широкого круга заболеваний, а не только при раке!**

*__Willem Scholten.__ *19th Expert Committee on the Selection and Use of Essential Medicines*, 2013

Наркотические средства, разрешенные к обороту в РФ *(список II)*

МНН / Состав	*Торговое наименование*	*Лекарственная форма*
Дигидрокодеин	**ДГК Континус**	**Таблетки пролонгированного действия**
Пропионилфенилэтоксиэтил-пиперидин	**Просидол**	**Таблетки защечные**
Тримеперидин	**Промедол**	**Раствор для инъекций**
Морфина гидрохлорид + носкапин + папаверина гидрохлорид + кодеин + тебаин	**Омнопон**	**Раствор для инъекций**
Морфин	**Морфин** **Морфина сульфат** **МСТ Континус**	**Раствор для инъекций** **Капсулы пролонгированного действия** **Таблетки пролонгированного действия**
Бупренорфин	**Бупранал** **Транстек**	**Раствор для инъекций** **Пластырь трансдермальный**
Бупренорфин+налоксон	**Бупраксон**	**Таблетки подъязычные**
Фентанил	**Фентанил** **Дюрогезик** **Фендивия** **Фентадол**	**Раствор для в/в и в/м введения** **ТТС*** **ТТС*** **ТТС***
Оксикодон+налоксон	**Таргин**	**Таблетки пролонгированного действия**

*** - *Трансдермальная терапевтическая система***

Наркотические средства, разрешенные к обороту в РФ *(список II)* и рекомендуемые для лечения интенсивной хронической боли

МНН / Состав	*Торговое наименование*	*Лекарственная форма*
Пропионилфенилэтоксиэтил-пиперидин	**Просидол**	**Таблетки защечные**
Морфин	**Морфин** **МСТ Континус**	**Раствор для инъекций** **Таблетки пролонгированного действия**
Бупренорфин	**Бупранал**	**Раствор для инъекций**
Бупренорфин + налоксон	**Бупраксон**	**Таблетки подъязычные**
Фентанил	**Фентанил** **Дюрогезик** **Фендивия**	**Раствор для в/в и в/м введения** **ТТС*** **ТТС***
Оксикодон + налоксон	**Таргин**	**Таблетки пролонгированного действия**

** - Трансдермальная терапевтическая система*

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

- Организация и развитие системы паллиативной медицинской помощи в системе здравоохранения
- Совершенствование законодательной базы по повышению доступности наркотических анальгетиков для пациентов с хронической болью
- Приведение в соответствие с федеральной нормативной базой всех документов, регламентирующих оборот наркотических анальгетиков в субъектах РФ
- Повышение квалификации всех медицинских работников по вопросам современной методологии лечения хронической боли
- Широкое внедрение в клиническую практику современных неинвазивных лекарственных форм опиоидных анальгетиков, доказавших свою эффективность и безопасность

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

www.msmsu.ru

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

www.palliamed.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

